

Kjemoterapi ved kolorektalcancer

ARTIKKEL

TVEIT KM

DAHL O

GERNER T

ANBEFALINGER FRA NORSK GASTROINTESTINAL CANCER GRUPPE

Sammendrag

Bruken av kjemoterapi ved kolorektalcancer har endret seg vesentlig de siste årene. Dokumentasjonen av kliniske effekter er styrket, både for adjuvant behandling i primærsituasjonen og ved utbredt sykdom. En oversikt over tilgjengelig dokumentasjon presenteres, sammen med anbefalinger fra Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe. Ved operabel kolorektalcancer, stadium Dukes B og C, bør pasientene inkluderes i den pågående randomiserte undersøkelse av fluorouracil og levamisol. Ved avansert metastaserende sykdom bør pasientene informeres om ev. behandling med fluorouracil og kalsiumfolinat, som hos 40-50% kan gi en palliativ symptomlindrende eller symptomforebyggende og muligens livsforlengende effekt. Objektiv målbar effekt sees hos 20-30%. Ofte er det likevel riktig ikke å gi kjemoterapi, etter en totalvurdering i samråd med pasient og pårørende.

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no