



# Resultater etter kirurgisk behandling av abdominale aortaaneurismer

---

ARTIKKEL

HAUG E SKAAHEIM

MYHRE HO

SÆTHER OD

STRØMHOLM T

NORDANG E

AADAHL P

---

## Sammendrag

I perioden 1983-93 ble 403 pasienter (median alder 69,5 år) operert for abdominalt aortaaneurisme, 246 pasienter elektivt og 58 med truende ruptur. 99 hadde rumpert aneurisme. 41,9% av pasientene hadde koronar hjertesykdom. Mortaliteten innen 30 dager var i de tre forannevnte grupper henholdsvis 4,1, 12,0 og 28,3%. Koronar hjertesykdom dominerte som dødsårsak. I gruppen med ruptur var blødning og komplikasjoner sekundært til dette en annen viktig dødsårsak. Det var ingen proteseinfeksjoner i dette materialet. Resultatene er i overensstemmelse med erfaringer fra andre sentre. Når nyere endovaskulære teknikker innføres, bør man sammenlikne resultatene med dem som oppnås ved åpen operasjon.

---

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no