



# Trombocytopeni utløst ved auranofinbehandling

---

ARTIKKEL

BAKKE E

MYKLEBUST G

GRAN JT

---

## Sammendrag

Trombocytopeni er en sjelden, men potensielt alvorlig bivirkning ved behandling med auranofin (Ridaura). I artikkelen beskrives tre pasienter som utviklet trombocytopeni under slik behandling. Etter seponering av medikamentet ble antall trombocytter normalisert i løpet av åtte uker. To pasienter ble behandlet med perorale kortikosteroider. Risikoen for å utvikle denne type bivirkning er liten (0,7%). Årsaksmekanismen er ikke klarlagt, men perifer platedestruksjon ansees som en mer sannsynlig mekanisme enn reduksjon i trombocyttoproduksjonen. Reduksjonen av antall blodplater kan utvikles hurtig eventuelt med kutane og mukokutane blødninger som første sykdomstegn. Pasientene bør i tillegg til regelmessige hematologiske kontroller få muntlig og skriftlig orientering om slike bivirkninger.

---

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra [tidsskriftet.no](http://tidsskriftet.no)