



# Diagnose og behandling av svær hyperlipidemi

---

ARTIKKEL

TONSTAD S

LEREN TP

OSE L

---

## Sammendrag

Svær hyperlipidemi (totalkolesterolnivå  $\geq 13$  mmol/l) er en sjelden tilstand der det er viktig å stille en korrekt diagnose. Vi undersøkte 57 pasienter med isolert hyperkolesterolemi. Fire var homozygoter for familiær hyperkolesterolemi, 52 var heterozygoter og én hadde sitosterolemi. Det ble funnet 15 forskjellige LDL-reseptormutasjoner blant gruppen med familiær hyperkolesterolemi. Kombinert hyperlipidemi der totalkolesterolnivået er  $\geq 13$  mmol/l, skyldes vanligvis en indremedisinsk sykdom som diabetes mellitus, nyre- eller leversykdom. Etter at grunn sykdommen er behandlet, bør behovet for lipidmodifiserende medisin vurderes på nytt. Når man unntar atorvastatin og fiskeoljekapsler, er preparater som reduserer triglyseridnivået betydelig, ikke registrert i Norge i dag. Vi presenterer aktuelle medikamenter som har vist virkning i kontrollerte studier.

---

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no