

Gonoré forårsaket av fluorokinolonresistente gonokokker

ARTIKKEL

DØSEN LK

MOI H

Sammendrag

Vi beskriver en pasient med gonoré forårsaket av fluorokinolonresistente gonokokker med flere episoder av behandlingssvikt og mulig reinfeksjon. Fluorokinoloner er siden 1995 anbefalt førstehåndsmiddel mot ukomplisert gonoré i Norge. Imidlertid har *Neisseria gonorrhoeae* en uttalt evne til å utvikle resistens, og på verdensbasis ser man nå en tiltakende utvikling av fluorokinolonresistente stammer. Ved Olafiapoliklinikken var 16% av de fremdyrkede gonoréstammene i 1997 helt eller delvis resistente mot ciprofloksacin, tilsvarende i Sverige 19%. Alle tilfeller av penicillinaseproduserende gonokokker er meldingspliktige til Meldingssystem for smittsomme sykdommer. Vi foreslår at gonokokkstammer med nedsatt følsomhet for fluorokinoloner også skal meldes. Gonoré er blitt en sjelden sykdom i Norge, og det tas for mange prøver til dyrking hos asymptomatiske individer med liten risiko. Oppfølging og smitteoppsporing av pasienter med gonoré må prioriteres.

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no