

Tidlig diagnose av medfødte hørselstap

ARTIKKEL

STØRDAL K

ANDERSSEN S-H

LUNDE JT

ANDERSEN R

SPONHEIM L

Sammendrag

Barn med medfødte hørselstap (prevalens 1/1000) får med dagens screeningprogram stilt diagnosen uakseptabelt sent (median alder 28 måneder). Nyere screeningmetoder som otoakustiske emisjoner og hjernestammeresponsaudiometri er tatt i bruk internasjonalt, alene eller i kombinasjon. Metodene blir benyttet både til screening av alle nyfødte og til undersøkelse av grupper med økt risiko for medfødte hørselsdefekter. Med bakgrunn i ti kjente risikofaktorer for hørselstap presenterer vi resultater fra screening av nyfødte. 283 av totalt 8980 barn (3,2%) født i Østfold i en treårsperiode er undersøkt med otoakustisk emisjonstest i nyfødtperioden. 16 barn hadde patologisk emisjonstest bilateralt ved gjentatt test og ble utredet videre ved øre-nese-hals-avdelingen. Ett av disse barna har fått påvist sikkert hørselstap.

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no