

Aktuell bruk av β -blokkere ved koronar hjertesykdom

ARTIKKEL

GULLESTAD L

BJØRNERHEIM R

OFFSTAD J

ENDRESEN K

FORFANG K

KJEKSHUS J

HANSTEEN V

Sammendrag

Det er foretatt en retrospektiv analyse av bruken av β -blokkere hos pasienter med koronar hjertesykdom. Av pasienter med stabil angina pectoris henvist til angiografisk utredning ved Rikshospitalet og Aker sykehus i tidsrommet 1990-97 brukte henholdsvis 78% og 70% β -blokkere, mens andelen av koronarpasienter som ble behandlet med slike medikamenter ved norske sykehus som deltok i 4S-studien, var 43% ved avslutning.

Av høyrisikopasienter synes diabetikere og pasienter med perifer karsykdom i dag å få β -blokkere like hyppig som lavrisikopasienter, mens andelen pasienter med stabil hjertesvikt som mottar slik behandling er langt lavere, ca. 15%. Ved akutt hjerteinfarkt fikk 10,5% av norske pasienter i Consensus II-undersøkelsen intravenøs β -blokade.

Dosen av de mest brukte β -blokkere var lav, 30-50% av dosene som er vist å bedre overlevelse etter hjerteinfarkt. Vi konkluderer med at bruken av β -blokade i Norge er lav ved akutt hjerteinfarkt og at den ved stabil koronarsykdom først og fremst er rettet mot symptomatisk lindring.

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

