

Barn med fødselsvekt ≤ 1500 g fra Nordland i perioden 1978-89

ARTIKKEL

WEIDLE B

HOLT J

Sammendrag

Behandlings- og oppfølgingsresultater for alle 271 levende fødte barn med fødselsvekt ≤ 1500 g fra Nordland fylke i perioden 1978-89 er gjennomgått. Gjennomsnittlig svangerskapslengde var 29 uker. 57 barn var veksthemmet. 33 barn ble transportert fra lokalsykehus til barneavdeling, 27 av disse ble hentet av barneavdelingens transportteam. Frekvens av keisersnitt økte fra 22% i den første til 58% i tredje fireårsperiode ($p < 0,005$). 103 barn (38%) døde før fire års alder. Antall døde i første, andre og tredje fireårsperiode viste en viss, men ikke-statistisk signifikant nedgang. 15 barn (5,5%) døde etter nyfødtpperioden, åtte av bronkopulmonal dysplasi og fire i krybbedød. Mortalitet korrigert for fødselsvekt ≤ 500 g, letale misdannelser og krybbedød var 32%. Mild, moderat og alvorlig funksjonshemming ble funnet hos henholdsvis 12%, 8,3% og 1,8%. 13 barn hadde cerebral parese (4,8% av levende fødte). Til tross for uendret mortalitet fikk færre barn funksjonshemming i løpet av studieperioden.

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no