

Normaltrykshydrocephalus - vurdering av utredningsprosedyrer

ARTIKKEL

TALLAKSEN CME

TAUBØLL E

NOME T

Sammendrag

Fra januar 1991 til desember 1996 ble 58 pasienter undersøkt med lumbal infusjonstest ved Nevrologisk avdeling, Rikshospitalet, som ledd i utredning av normaltrykshydrocephalus. I forbindelse med evaluering av undersøkelsesprotokollen ble det gjennomført en retrospektiv studie av alle infunderte pasienter. 20 var blitt henvist til neurokirurgisk avdeling og shuntet. Kriteriene som det ble lagt vekt på for henvisning til kirurgisk behandling (klinisk undersøkelse, cerebral CT, infusjonstest, cisternografi) blir gjennomgått og diskutert i forhold til egne resultater og litteratur. Ingen enkeltkriterier kunne alene skille normaltrykshydrocephalus fra andre tilstander. Hovedkonklusjonen er at en mer systematisk registrering og undersøkelse av pasientene samt bedret oppfølging er nødvendig for lettere å kunne velge ut riktige kandidater til shuntkirurgi. Spesielt har studien vist betydningen av rask utredning og behandling for et optimalt operasjonsresultat.

Publisert: 17. oktober 2018. Tidsskr Nor Legeforen. DOI:

© Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. Lastet ned fra tidsskriftet.no