

## Appendiks 1.

### Prøvemateriale undersøkt med to ulike målgene for PCR (N=11)

Pasient	Prøvemateriale <sup>1,2</sup>	18S rDNA	AAP3
1	Blod	Positiv	Negativ
2	Miltbiopsi	Positiv	Positiv
3	Stansebiopsi	Positiv	Positiv
4	Stansebiopsi	Positiv	Positiv
5	Stansebiopsi	Positiv	Positiv
6	Stansebiopsi	Positiv	Positiv
	Filterpapir <sup>3</sup>	Positiv	Negativ
7	Stansebiopsi	Positiv	Positiv
	Filterpapir <sup>3</sup>	Positiv	Negativ
8	Stansebiopsi <sup>4</sup>	Negativ	Negativ
	Filterpapir <sup>3</sup>	Positiv	Negativ
9	Stansebiopsi	Negativ	Negativ
	Filterpapir <sup>3</sup>	Negativ	Negativ
10	Stansebiopsi	Positiv	Negativ
	Finnålsbiopsi	Negativ	Negativ
	Sårskorpe	Negativ	Negativ
	Såravskrap	Negativ	Negativ
	Filterpapir fra stansebiopsi	Negativ	Negativ
	Filterpapir fra finnålsbiopsi	Negativ	Negativ
11	Stansebiopsi	Positiv	Positiv
	Filterpapir <sup>3</sup>	Negativ	Negativ

<sup>1</sup>Det manglet prøvemateriale for tre pasienter.

<sup>2</sup>DNA ble ekstrahert direkte fra prøvene med QIamp DNA Mini Kit (Qiagen, Hilden, Tyskland). FTA Purification Reagent (Sigma-Aldrich) ble benyttet ved DNA ekstraksjon fra filterpapir.

<sup>3</sup>FTA-kort tatt direkte fra sårbunn.

<sup>4</sup>Det forelå svært lite prøvemateriale.