

Hvilke matvarer bør gravide unngå?

Statens næringsmiddeltilsyn har utviklet en Internett-side om matvarer gravide bør unngå for at barnet ikke skal få i seg skadelige bakterier, parasitter, miljøgifter eller andre uheldige stoffer.

– Målgruppen for tjenesten er gravide, men helsepersonell som er i kontakt med gravid bør vite om Internett-siden slik at de kan henvise gravide til den, sier Gro Warholm i Statens næringsmiddeltilsyn.

Internett-siden består av tekster med råd og lenker til utdypende informasjon, for den som måtte ønske å gå litt dypere inn i stoffet. Sidene gir råd både om vanlig matvarer i et norsk kosthold og mer spesielle matvarer som kun et fåtall gravide vil ha et forhold til.

Risikovurderingene som ligger til grunn for rådene, er gjort av Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapelige komité. Det er første gang næringsmiddeltilsynet har laget en slik samlet oversikt over matvarer gravide bør unngå.

Internett-adressen til siden er:
www.snt.no/nytt/kosthold/gravide/
 (SBN).
www.legeforeningen.no/index.db2?id=14036

Misvisende om anestesileger og aktiv dødshjelp

– Beskyldningene i dagspressen om at norske anestesileger driver med aktiv dødshjelp er grunnløse og krenkende.

Det sier Jon Henrik Laake, anestesilege ved Rikshospitalet og redaktør for nettsidene til Norsk anesthesiologisk forening. Han reagerer med sinne og vantro på oppslag i dagspressen der det hevdes at «én av 20 norske anestesileger innrømmer at de utfører aktiv dødshjelp».

– Aktiv dødshjelp er en meget alvorlig forbrytelse. Enhver antydning om at dette foregår hyppig blant anesthesiologer, må være svært godt underbygd, sier Laake.

Oppslagene baserer seg på en studie utført ved Legeforeningens forskningsinstitutt, publisert i det anesthesiologiske tidsskriftet *Resuscitation*. Det er en spørreskjemaundersøkelse blant 1 616 norske leger om medisinske problemstillinger rundt behandling av livstruende og alvorlig syke. Blant samtlige leger er det 1 % som bekrefter at de har gitt aktiv dødshjelp.

Laake hevder at artikkelen i *Resuscitation* inneholder tallfeil. – Det angis at fire av 40 anestesileger har svart bekræftende på at de har utført aktiv dødshjelp. Riktig tall skal være tre av 55 anestesileger, har forskningsinstituttet meddelt meg. Det står også at 2,5 % av de 1 616 respondentene var anestesileger, og det blir jo ikke mer enn 33 leger. Hvor kommer da de resterende 22 fra? spør Laake.



Olaf G. Aasland ved forskningsinstituttet beklager at artikkelen blir brukt som en anklage mot anestesileger. – Studien gir ikke grunnlag for slike beskyldninger, og det er heller ikke intensjonen. Blant de 55 anestesilegene som inngår i undersøkelsen er 33 ferdige spesialister og 22 under spesialisering, presiserer Aasland.

– Av tallene fremgår det at anestesileger har en høyere sannsynlighet enn andre leger for å avslutte medisinsk behandling i livets slutfase. Det er anestesilegene som oftest møter dette problemet, og det har vi bevisst ønsket å få frem. Et sentralt poeng er at anestesilegene ikke skiller seg signifikant fra andre leger i spørsmålet om aktiv dødshjelp. Derfor kan jeg ikke stå inne for dagspressen fremstilling, sier Aasland. (TS).

www.legeforeningen.no/index.db2?id=13879

TIDSSKRIFTET PÅ INTERNETT

Nyheter publiseres fortløpende på:
www.tidsskriftet.no

Søkbare fulltekstversjoner på nett:
www.tidsskriftet.no

E-postabonnement på innholdsfortegnelsen:
www.tidsskriftet.no

Kunnskapsprøver:
www.tidsskriftet.no/quiz

Stillingsdatabase og mulighet til å bli varslet om ledige legestillinger via e-post:
www.tidsskriftet.no/stilling

Siden litteratur for leger:
www.tidsskriftet.no/bok

Bivirkningsdødsfall blant barn

Dødsfall blant barn etter bivirkninger av legemidler forekommer oftest i sammenheng med epilepsilegemidler. Det viser en britisk studie som er presentert i *Archives of Disease in Childhood*. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13842

Helse Sør trimmer foretaksstrukturen

Antall helseforetak i Helse Sør RHF skal reduseres fra 13 til ni i 2003, og videre ned til åtte i 2005. Dette har styret i Helse Sør RHF vedtatt i forbindelse med behandlingen av fireårsplanen Resept 2006. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13952

Angioplastikk fremfor trombolytisk behandling?

Flere pasienter med akutt hjerteinfarkt bør få primær angioplastikk som standardbehandling. Det går frem av ny rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering (SMM).

www.legeforeningen.no/index.db2?id=13574

– Allmennleger mangler kunnskap om HIV

– Allmennleger og annet helsepersonell i primærhelsetjenesten mangler fortsatt kunnskap om HIV-positive, sier Arne Grønningsæter ved forskningsstiftelsen FAFO. I forbindelse med Verdens AIDS-dag la han frem resultater fra en undersøkelse om livskvalitet og levekår blant HIV-positive. www.legeforeningen.no/index.db2?id=13662