

ANNONSER

- 1842 Legejobber
- 1853 Kurs og møter
- 1855 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

- 1857 Uro over ny spesialistutdanning
Marit Hermansen
- 1858 En slags utenriksminister
- 1860 Hun avslørte onde tvillinger
- 1861 Lanserer nettkurs
om dopingbruk blant ungdom
Veier og måler barn
- 1862 Tiårsmarkering for Norm
for informasjonssikkerhet

GJESTESKRIBENT

- 1864 Grete Herlofson
Vi er hverandres nødvendighet

**FORSIDEN**

Illustrasjon © Nina Børke/Werksemd

De tidligste nedtegnelser av behandling av brannskader kommer fra oldtidens Egypt. Legene dekket brannsåar med bandasjer dyppet i brystmelken til mødre som ammet guttebarn. I dag vet vi at infeksjoner er vanligste dødsårsak ved brannskader og at morsmelk har antiseptiske egenskaper.

LES MER ...**Fra redaktøren**

Er overdragelse av fellesskapets institusjoner til private og anbud på offentlige helse- og sosialtjenester tegn på at velferdsstaten forvitrer?

Se leder side 1785

Brannskader

Hvert år blir flere enn 600 pasienter innlagt i norske sykehus etter en brannskade. Til tross for forebyggende tiltak synes antallet å ha vært noenlunde konstant i flere år. Dette viser en gjennomgang av data fra Norsk pasientregister og Haukeland universitetssykehus. Småbarn er særlig utsatt for brannskader, med kontakt med svært varme væsker eller flater som vanligste skademekanisme.

Side 1799

Urinsyregikt

Urinsyregikt er karakterisert av opphopning av urinsyrekrystaller i ledd eller seneskjeder og kraftig inflammatorisk reaksjon. Slike krystallavleiringer kan påvises ved ultralydundersøkelser av ledd og ved polarisasjonsundersøkelse av leddvæske, men i klinisk praksis kan diagnosen også stilles på grunnlag av smertebeskrivelse og bildediagnostikk. For å forebygge nye anfall må urinsyrenivået reduseres.

Side 1804

Strålingsindusert katarakt kan forebygges

Skader på øyelinsen kan forekomme ved vesentlig lavere stråledoser enn tidligere antatt. Personer som er utsatt for betydelig stråleeksponering i sitt yrke, har økt risiko for strålingsindusert katarakt. Bruk av blyglassbriller beskytter øyelinsen. Nye grenseverdier for stråleeksponering må innføres.

Side 1809

Kvinnen som ikke gjenkjente sitt eget ansikt

En kvinne i 40-årene utviklet hodepine, først i anfall, senere konstant. Hodepinen ble etter hvert ensidig og verst rundt høyre øre. Da hun så ble forvirret – hun gjenkjente verken eget eller samboers ansikt – ble hun innlagt i nevrologisk avdeling.

Side 1815