

ANNONSER

- 1030 Legejobber
1041 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN

- 1043 Multiresistente bakterier –
en trussel mot folkehelsen
Marit Hermansen
- 1044 Kampen mot resistensen
- 1046 Bretter opp ermene
for ny spesialisstruktur
- 1047 Altfor få leger på avdelingen
Stolt kardiolog
- 1048 Krevende øvelse i samhandling
og logistikk
- 1050 Bekymret for flyktningers helse

GJESTESKRIBENT

- 1052 Berit Berg
Barn på flukt

**FORSIDEN**

Illustrasjon © Xueting Yang

Nedsatt syn hos barn er en utfordring, både for barnet selv og for dem rundt det. Kunnskap om norske barns øyehelse vil bidra til bedre forebygging, behandling og oppfølging. Likevel er Norge det eneste landet i Norden som ikke har et øyemedisinsk register.

LES MER ...**Fra redaktøren**

Legeforeningens landsstyremøte 2016 vedtok lovendringer som gjør Tidsskriftets redaksjonelle integritet enda tydeligere. Det vil tjene både Tidsskriftet, Legeforeningen og norske leger

Se leder side 977

Barn og unge med nedsatt syn

Mer enn halvparten av barn og unge med nedsatt syn har andre funksjonsvansker, oftest motoriske eller kognitive problemer. Om lag en tredel er blinde. Hyppigste årsaker til nedsatt syn er nevrooftalmologisk sykdom og sykdom som rammer retina og øyeeplet. Dette viser en gjennomgang av medisinske data fra de fylkesvise synspedagogiske sentrene.

Side 978, 992

Mendelsk randomisering – hva er det?

Epidemiologiske funn må tolkes. Epidemiologer er som regel forsiktige med å fastslå at man har funnet en årsakssammenheng, blant annet pga. mulig konfunderende faktorer. Ved mendelsk randomisering, basert på fordelingen av genetiske varianter, begrenses slike feilkilder. Metoden kan bidra til å avdekke påvirkbare sykdomsårsaker.

Side 979, 1002

Anti-NMDA-reseptorencefalitt

I 2007 ble det for første gang beskrevet et klinisk syndrom forårsaket av autoantistoffer rettet mot N-metyl-D-aspartatreseptoren i hjernen. Tilstanden starter gjerne med vrangforestillinger, hallusinasjoner eller mani, men etter hvert utvikles også nevrologiske symptomer. Tilstanden bør utelukkes hos pasienter med nyoppstått psykose. Prognosen er god med riktig behandling.

Side 1006

Ulcerøs kolitt med komplikasjoner

Pasienter med inflammatorisk tarmsykdom som får immunsupprimerende behandling, kan utvikle flere komplikasjoner. Les og lær om en slik pasient som ble innlagt pga. mistanke om forverring av sin tarmsykdom.

Side 1010