

Farlige dobbeltforskrivninger

Rydd i Reseptformidleren før du skriver ut en ny resept.

En middelaldrende mann kom fra sykehuset og skulle hente ut medisiner på apoteket. I Reseptformidleren fant man blant annet følgende forskrivninger: Atacand (candesartan) 16 mg og 32 mg, Candesartan 32 mg, Lipitor 10 mg og 20 mg og Selo-Zok 50 mg, 100 mg og 200 mg. To primærleger og en sykehuslege hadde skrevet ut disse reseptene. Alle tre hadde jobbet i sitt lokale journalsystem, uten å sjekke og rydde i Reseptformidleren.

Dette er et farlig rot. Man kan lure på hva som er å finne av medisiner hjemme hos pasienten, hvilke medisiner han pleier å ta og hvorfor han havnet på sykehus. Man kan også tenke seg at bare SeloZok 200 mg ble utespedit og at pasienten etter tre måneder ville komme tilbake til apoteket for å hente mer. Da ville bare reseptene på 50 mg og 100 mg være synlige.

Nå som spesialisthelsetjenesten har tatt i bruk elektroniske resepter, er det vanlig at flere leger skriver resepter til samme

«Man kan lure på hva som er å finne av medisiner hjemme hos pasienten»

pasient. Dette eksemplet er det verste jeg har sett, men som apotekfarmasøyt ser jeg slike «dobbelte» forskrivninger daglig.

Budskapet er: Legene må alltid gå inn i Reseptformidleren og rydde før de skriver ut en ny resept.

Stein Lyftingsmo
stein@lyftingsmo.no

Stein Lyftingsmo (f. 1950) er farmasøyt ved Apotek1 Østbyen, Hamar. Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Mottatt 5.12. 2016 og godkjent 30.1. 2017. Redaktør: Ketil Slagstad.

Publisert først på nett.