

ANMELDELSER

644 Bøker

LEGELIVET

647 Kristine Husøy Onarheim

648 Billett merket kontakt
Alexander Wahl

649 Start resolusjonen

650 Kreftisiko etter
fertiliseringsbehandling i Norge
Sjukefråvær og rehabilitering
etter traumatisk hjerneskade651 Plexus brachialis-nerveblokkade
Epilepsi hos blivende foreldre

652 Nye doktoravhandlinger

ANNONSER

653 Legejobber

661 Diverse annonser

662 Kurs og møter

663 Spesialister

AKTUELT I FORENINGEN665 I solidaritet med dr. Küni
*Marit Hermansen*666 Stavanger slår et slag
for unge fastleger668 Vil engasjere fastleger
i kvalitetsarbeid

669 Kunsten å megle

670 Ansvarsforsikring for leger

671 – Legevakt må settes
på dagsordenen**GJESTESKRIBENT**672 Paal-André Grinderud
Jeg har så mye å takke for**FORSIDEN**

Illustrasjon © Åge Peterson

«Norge – Noreg, du herlige land! Vårt dyre, tvidelte bindestreksland! Kløyvd og delt, frå hei til strand», skrev historikeren Hans Fredrik Dahl. I medisinen kaller vi det *uønsket variasjon*.

LES MER ...**Fra redaktøren**

Nordmenn er verdens lykkeligste folkeslag.

Se leder side 591

Avansert behandling ved Parkinsons sykdom

Pasienter med Parkinsons sykdom med store motoriske fluktasjoner kan ha nytte av dyp hjernestimulering eller kontinuerlig pumpebehandling med et dopaminpreparat eller dopaminantagonist. Bruken av slike avanserte behandlingsformer varierer mellom fylkene, selv om behandlingssentrene ikke synes å prioritere pasienter fra eget nær-område. Dette viser data fra sykehusenes operasjonsstatistikk og Reseptregisteret.
Side 619

Amputasjon og rehabilitering

De fleste pasientene som ble innlagt for rehabilitering etter benamputasjon ved Sørlandet sykehus i perioden 2012–15, brukte den tilpassede protesen ett år senere. Flertallet oppnådde god funksjon og høy grad av selvhjelpenhet etter rehabilitering til tross for relativ høy alder, dårlig gangfunksjon før operasjon og flere tilleggssykdommer.
Side 624

Mindre smerter ved lokalbedøvelse

Stadig flere og større kirurgiske inngrep foretas i lokalbedøvelse, som i seg selv kan være smertefull. Enkle tiltak som bufring med natriumbikarbonat og oppvarming av lidokainoppløsningen før injeksjon kan redusere smerten. Penetrasjon av huden i 90° vinkel og bruk av tynne kanyler kan også gi mindre smerte.
Side 629

Spontan disseksjon av koronarkar

Spontan koronar arteriedisseksjon er en uvanlig årsak til akutte brystmerter og plutselig hjertedød. Tilstanden er vanligst hos yngre og middelaldrende kvinner uten risikofaktorer for aterosklerose. Diagnosen stilles oftest ved koronar angiografi. Konservativ behandling anbefales ved god koronar blodstrøm og stabil hemodynamikk.
Side 631